

**Voorbeeld blanco standaard verslag voor initiële stadiering of biochemisch recidief:**

Eerder onderzoek ter vergelijking: \*\*\*

Toegediende activiteit: \*\*\* MBq 18F-PSMA-\*\*\*/68Ga-PSMA-11

Interval injectie en scan: \*\*\* minuten

Scanbereik: Kruin t/m midfemoraal

Er werd een low dose CT/ high dose CT, met/ zonder contrastmiddel verricht.

Er werd wel/geen furosemide toegediend.

Prostaat/prostaatbed: \*\*\*

*(Beschrijving van T-stadium op PET: beschrijving localisatie uitbreiding buiten het kapsel ja/nee, uitbreiding in de vesicula(e) seminales ja/nee, betrokkenheid van omliggende structuren, unifocaal/multifocaal en intensiteit van PSMA-uptake (SUVmax of TBR))*

Lymfeklieren:

*(Beschrijvend dan wel in tabelvorm. Indien niet de samenvattende tabel gebruikt wordt in tekst ook de confidentie score/PSMA rads geven.)*

Anatomische locatie	i TNM	Grootte	Aantal	PSMA Expressie Q (SUVmax)	PSMA Expressie V	Confidentie score
Iliaca externa						
Presacraal						
Obturatoriuslo ge						
Iliaca interna						
Iliaca communis						
Para- aortaal/retrope ritoneaal						
Ander pelviene klieren (paravesicaal/ mesorectaal)						
Ander abdominaal focus						
Diaphragma tot cervicaal						

Met name voor eventueel later gebruik van de data in studieverband wordt bovenstaande tabel geadviseerd. Indien geen kwantificatie gewenst wordt kan als alternatief kan onderstaande tabel worden overwogen.

Lokatie	Beschrijving	Score 1-5 (PSMA rads)
Iliaca externa	***	***
Presacraal	***	***
Obturatoriusloge	***	***
Iliaca interna	***	***
Iliaca communis	***	***
Para-aortaal/retroperitoneaal	***	***
Anderere pelviene klieren (paravesicaal/ mesorectaal)	***	***
Ander abdominaal focus	***	***
Diaphragma tot cervical	***	***

Skelet: \*\*\*

(indien focale uptake van PSMA: beschrijf of er sclerotisch/lytisch substraat zichtbaar is, geef een confidentie score en evt SUVmax)

Visceraal: \*\*\*

(wel/geen aanwijzingen voor viscerale metastasen)

Nevenbevindingen: \*\*\*

Conclusie: \*\*\* (Volgens TNM)